



SZYBKA ALKOHOLOWA DEZYNFEKCJA

Incidin™ Liquid

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI PRZY POMOCY GOTOWEGO DO UŻYCIA PREPARATU ALKOHOLEWEGO

Incidin™ Liquid oferuje niezawodną dezynfekcję dzięki szerokiemu spektrum działania mikrobójczego, które obejmuje prątki gruźlicy oraz Norowirusy.

Incidin™ Liquid zapewnia również:

- Krótkie czasy działania
- Formułę niezawierającą barwników i substancji zapachowych
- Doskonałą tolerancję materiałową na powierzchniach odpornych na działanie alkoholi
- Możliwość stosowania wraz z systemem suchych chusteczek Incidin Dry Wipes System



Incidin™ Liquid

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI PRZY POMOCY GOTOWEGO DO UŻYCIA PREPARATU ALKOHOLOWEGO

SZEROKIE SPEKTRUM DZIAŁANIA W KRÓTKIM CZASIE

Dzięki szerokiemu spektrum skuteczności mikrobójczej i krótkim czasom działania, Incidin Liquid znakomicie sprawdza się nawet w obszarze intensywnej opieki medycznej i innych obszarach podwyższonego ryzyka. Czasy działania zostały wyszczególnione w tabeli poniżej.

NIEZAWODNOŚĆ STOSOWANIA

Ponieważ Incidin Liquid jest gotowym do użycia preparatem o potwierdzonej tolerancji materiałowej z powierzchniami odpornymi na działanie alkoholu, produkt zapewnia niezawodność stosowania we wszelkich obszarach, do których został przeznaczony.

FORMUŁA BEZ BARWNIKÓW I SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH

Dzięki formule niezawierającej barwników, ani substancji zapachowych, na powierzchniach nie pozostają żadne pozostałości substancji aktywnych, a stosowanie produktu jest wygodne.

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

SPEKTRUM DZIAŁANIA	CZAS DZIAŁANIA
Bakteriobójczy według EN 13727 (30 sek.) / EN 16615 (1min)	1 min**
Drożdżakobójczy według EN 13624 (30 sek.) / EN 16615 (1min)	1 min**
Bójczy wobec prątków gruźlicy według EN 14348 / metodyki EN 16615	1 min**
Działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe wg EN 14476	30 sec**
Ograniczone spektrum działania wirusobójczego według EN 14476 (Adenowirus - 1min, Norowirus - 30 sek.)	1 min**

* warunki brudne ** warunki czyste

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

PRODUKT	ILOŚĆ	KOD PRODUKTU
Incidin™ Liquid	12 but. x 650 ml ze sprysk.	3096280
Incidin™ Liquid (1 spryskiwacz/karton)	12 but. x 1 l	3096240
Incidin™ Liquid	2 kan. x 5 l	3096340

WYRÓB MEDYCZNY I PRODUKT BIOBÓJCZY UŻYWAJ BEZPIECZNIE

Zapoznaj się z etykietą i informacją o produkcie.

OBSZAR ZASTOSOWANIA



Wyrób medyczny: Gotowy do użycia płyn do dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

Produkt biobójczy: do powierzchni ogólnych.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

650 ml i 1L ze spryskiwaczem:

Przed użyciem oczyścić powierzchnię. Spryskać powierzchnię z odległości ok. 30 cm, następnie przetrzeć czystą ściereczką i pozostawić do wyschnięcia. Alternatywnie, nanieść produkt na czystą chusteczkę, całkowicie przetrzeć powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia. Przestrzegać wskazanego czasu kontaktu dla wymaganej aktywności przeciwdrobnoustrojowej.

Wyrób medyczny: Sptukiwanie nie jest konieczne, chyba że obszary, w których produkt został zastosowany, mają wejść w kontakt ze skórą lub błoną śluzową. Należy zapoznać się z instrukcją mycia i dezynfekcji producenta wyrobów medycznych. Przed użyciem sprawdzić kompatybilność powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Wszelkie poważne incydenty powstałe w wyniku stosowania wyrobu medycznego należy zgłaszać wytwórcy oraz właściwemu organowi państwowemu.

Kanister 5L:

Przed użyciem oczyścić powierzchnię. Nanieść produkt na czystą chusteczkę, np. INCIDIN™ DRY WIPES System (szczegółowa instrukcja przygotowania suchych chusteczek znajduje się na opakowaniu suchych chusteczek), całkowicie przetrzeć powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia. Upewnić się, że powierzchnia jest całkowicie mokra. Przestrzegać wskazanego czasu kontaktu dla wymaganej aktywności przeciwdrobnoustrojowej.

Wyrób medyczny: Sptukiwanie nie jest konieczne, chyba że obszary, w których produkt został zastosowany, mają wejść w kontakt ze skórą lub błoną śluzową. Należy zapoznać się z instrukcją mycia i dezynfekcji producenta wyrobów medycznych. Przed użyciem sprawdzić kompatybilność powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Wszelkie poważne incydenty powstałe w wyniku stosowania wyrobu medycznego należy zgłaszać wytwórcy oraz właściwemu organowi państwowemu.

SKŁAD

100 g preparatu zawiera: 35g 2-Propanol (CAS N° 67-63-0), 25g Propanol-1-ol (CAS N° 71-23-8).

PRZECHOWYWANIE

Produkt powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pomiędzy 0°C a 25°C w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych.



WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO